

## اهمیت سنجش شنوایی در نوزادان

### ❖ چرا سنجش شنوایی در نوزادان مهم است؟

بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت در هر ۱۰۰۰ تولد زنده، ۱ تا ۳ نوزاد با نقص شنوایی وجود دارد که باید این موارد به موقع شناسایی و درمان شوند.

### ❖ آزمایش غربالگری شنوایی در نوزادان چه موقع باید انجام شود؟

تمام نوزادان باید در روزهای ۳ تا ۵ بعد از تولد، به مراکز غربالگری شنوایی مراجعه نمایند. در صورت فراموشی و یا تاخیر در مراجعه به مراکز غربالگری طی روزهای تعیین شده؛ توصیه می‌شود والدین با مراجعه به این مراکز، انجام آزمایش غربالگری را پیگیری نموده و از تاخیر در انجام آزمایش، پرهیز نمایند.

### ❖ کم شنوایی و ناشنوایی نوزادان چه علائمی دارد؟

کم شنوایی و ناشنوایی در نوزادان علائم ظاهری خاصی ندارد. شنوایی شناس (ادیولوژیست) با انجام آزمایش توسط تجهیزات مخصوص، نوزادان دارای اختلال شنوایی را شناسایی و برای تشخیص و درمان، ارجاع می‌نماید.

### ❖ تاخیر در تشخیص و درمان کم شنوایی و ناشنوایی چه مشکلاتی را برای نوزادان و کودکان به همراه دارد؟

- اختلال در رشد گفتاری و زبانی
- ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران
- کند شدن رشد تحصیلی
- انزای اجتماعی و احساس تنهایی

### ❖ کدام یک از نوزادان بیشتر در معرض خطر ابتلا به کم شنوایی یا ناشنوایی هستند؟

- نوزادان نارس
- نوزاد با وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم
- نوزاد با سابقه تعویض خون
- نوزادان مبتلا به مننژیت و یا سایر عفونت‌ها
- نوزادان با سابقه بستری در بخش مراقبت ویژه (NICU)
- وجود سابقه کم شنوایی در خویشاوندان
- نوزادانی که مادر آنها در زمان بارداری مبتلا به بیماری توکسوپلاسموزیس، سرخجه، سیفلیس، HIV و ... باشد.

### ❖ برای انجام سنجش شنوایی نوزادان، به کدام مراکز مراجعه کنیم؟

حتما به مراکز مورد تایید، مراجعه شود. لیست اسامی این مراکز، در زمان ترخیص از زایشگاه و یا زمان مراجعه به پایگاه سلامت یا خانه بهداشت، در اختیار والدین قرار داده می‌شود.