

کلسترون بالا

آیا می دانید:

۲۸ درصد افراد ۱۵ تا ۶۴ سال کشورمان کلسترون بالا دارند. یعنی ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار ایرانی از این مشکل رنج می برند و سالانه ۳۴۰۰۰ نفر به علت چنین مشکلی می میرند.

به عبارت دیگر:

از هر ۴ نفر یک نفر کلسترون بالا دارد

شما در برابر سلامت خود، خانواده و جامعه چه مسؤولیتی دارید؟

با رعایت این توصیه ها از سلامت خود و اعضای خانواده تان، مراقبت کنید:

- برای جلوگیری از افزایش کلسترون، رژیم غذایی سالم، کنترل وزن و افزایش فعالیت بدنی و برنامه منظم ورزشی از اصول اولیه و مهم هستند.
- چه غذاهایی را کمتر بخوریم:
- کاهش چربی دریافتی، به ویژه چربی های اشباع، و کلسترون یکی از اصول رژیم غذایی مناسب در پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی است.

- لبنيات کم چرب(شیر، ماست، پنیر و ...) را جایگزین لبنيات پر چرب کنید.
- از سر شیر و خامه کمتر استفاده کنید. اين مواد غذائي حاوي مقادير زيادي چربی حيواني هستند و می توانند موجب افزایش کلسترول خون بشوند.
- به جاي گوشت هاي پر چرب از گوشت هاي کم چرب استفاده کنيد و چربی قابل رویت گوشت را پیش از پخت تا آنجا که ممکن است جدا کنید. پیش از طبخ مرغ، پوست را از آن جدا کنید.
- مصرف گوشت قرمز را کاهش داده و بجای آن از گوشت هاي سفید مانند مرغ و ماهي استفاده کنيد. مصرف ۳-۲ بار در هفته ماهي توصيه می شود.
- در طبخ غذاها از انواع روغن مایع به ویژه روغن زيتون و روغن کلزا و يا کنجد استفاده کنيد(براي پختن، نه سرخ کردن).
- روغن جامد مصرف نکنيد.
- غذاهاي آماده مانند پيتزا، سوسیس، كالباس، همبرگر، غذاهاي سرخ کرده (سیب زمینی سرخ کرده، چیپس و) حاوي مقادير زيادي چربی هستند. مصرف اين نوع غذاها را محدود کنيد.
- از شيريني هاي خامه اي و سس هاي چرب مانند مايونز کمتر استفاده کنيد. با مخلوط کردن ماست کم چرب، آبلیمو، سركه و يا آب نارنج، کمی نمک و فلفل و سبزی هاي معطر و روغن زيتون يك سالاد سالم و خوش طعم در منزل تهيه کنيد.
- كله پاچه، مفرز، دل و قلوه و سيرابي داراي مقدار زيادي کلسترول است. مصرف اين غذاها را محدود کنيد.
- سس هاي سفید رژيمی بهتر از سس هاي سفید معمولی است: يك قاشق غذاخوری از آنها ۵۰ کيلوگالري انرژي در بدن تولید می کنند، برای همین افرادی که حتی کلسترول خون هم دارند، می توانند به میزان خيلي کم از اين نوع سس ها بخورند.
- اگر مبتلا به بيماري هاي قلبی-عروقی، چربی خون بالا، فشار خون بالا و چاقی هستيد و يا سابقه فاميلى اين بيماري ها را داريد، مصرف زرده تخم مرغ را به ۳ تا ۴ عدد در هفته، چه در داخل غذاها و چه به تنهايی محدود کنيد. استفاده از سفیده تخم مرغ مشکلي ايجاد نمي کند.

● چه غذاهایی را بیشتر بخوریم:

- مصرف میوه‌ها و سبزی‌ها را در برنامه غذایی روزانه افزایش دهید، انواع میوه‌ها و سبزی‌های تازه سرشار از ویتامین و املاح و موادی به نام آنتی اکسیدان‌ها هستند که خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را کاهش می‌دهند. از آن جمله سبزی‌های برگ سبز تیره و میوه‌های زرد و نارنجی و قرمز بسیار با اهمیت هستند.
- در برنامه غذایی روزانه، مقدار کافی شیر و مواد لبنی بگنجانید. کلسیم موجود در شیر و مواد لبنی موجب کاهش کلسترول بد و افزایش کلسترول خوب می‌شود. با مصرف روزانه دو لیوان شیر کم چرب، یک پیاله ماست کم چرب یا سایر مواد لبنی کم چرب مانند پنیر و کشک می‌توان کلسیم مورد نیاز را به دست آورد.
- از غلات سبوس دار مانند نان جو و سنگک و نان بربی و سایر نان‌هایی که مطمئن هستید یا با آرد کامل تهیه شده‌اند، استفاده کنید.
- مصرف فیبر غذایی را افزایش دهید، حبوبات، انواع سبزی‌ها مانند هویج، چغندر، کاهو، کرفس، انواع کلم، و غذاهای سبوس دار که منابع غنی فیبر محلول هستند، کلسترول بد را کاهش می‌دهند.
- مصرف سویا و فرآورده‌های آن موجب کاهش سطح کلسترول خون می‌شود.
- مصرف سیر و پیاز در کاهش کلسترول و تری گلیسیرید موثر است.

● عادت‌های خوب را در تغذیه خود و خانواده تقویت کنید:

- همیشه سفره سالاد بگذارید تا همه اعضای خانواده از آن مصرف کند. سالاد را می‌توان با تنوع بسیار و هر بار با سبزی‌های گوناگون تهیه کرد.
- وجود سبزی خوردن در سفره یکی از عادت‌های خوب غذایی ما ایرانیان است. با مصرف سبزی‌های خام، فیبر کافی و انواع ویتامین‌ها و املاح را به بدن خود برسانید.
- اگر شما به سر کار می‌روید حتماً هر روز مقداری میوه شسته شده همراه خودتان بردارید. یک میان وعده سالم را به جای بیسکویت و یا شیرینی که ممکن است چربی‌های نامناسبی داشته باشد، جایگزین کنید.

- برای کودکان و سایر افراد خانواده هم که صبح از خانه خارج می شوند، میوه و لقمه سالم تهیه و آنها را به خوردن آن تشویق کنید. گرسنگی در خارج از خانه ممکن است موجب مصرف غذاهای نامناسب، فست فود و غذاهای خیابانی شود که اغلب چرب، غیر بهداشتی و برای سلامت زیان آورند. در هنگام خرید مواد غذایی برچسب آن را جهت تعیین میزان و نوع چربی کنترل کنید.
- وقتی به رستوران می روید و یا از رستوران غذا سفارش می دهید بخواهید کره و یا مارگارین روی غذای تان نگذارند. کودکان اگر چاق نباشند، به دلیل جنب و جوش بیشتری که دارند می توانند غذا را چرب تر بخورند.
- پرفشاری خون و افزایش کلسیرون خون فاقد هرگونه علامتی هستند بنابراین شما باید به طور منظم از لحاظ ابتلا به افزایش فشار خون و کلسیرون خون بررسی شوید.